

Leczenie pewnymi antybiotykami (przy dowolnej infekcji) może również wpływać na długość nosicielstwa. Skuteczne praktyki higieniczne oraz stosowanie standardowych środków ostrożności wobec wszystkich osób objętych opieką ograniczą transmisję bakterii Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy.

Gdzie znaleźć więcej informacji

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, porozmawiaj z członkiem personelu opiekuńczego, który może również skontaktować się z Zespołem Zapobiegania i Kontroli Infekcji (Infection Prevention and Control Team) w Twoim imieniu. Strona internetowa UKHSA to kolejne źródło informacji.

Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia Wielkiej Brytanii (UKHSA)

Ramowy plan działań mających na celu ograniczenie Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy (wrzesień 2022)

<https://www.gov.uk/government/publications/actions-to-contain-carbapenemase-producing-enterobacterales-cpe>

(Strona sprawdzona 25 września 2024 r.)

Ta ulotka zawiera informacje sektora publicznego objęte licencją Open Government Licence v3.0. Dostępne na: <https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/>



Bakterie Enterobacterales wytwarzające Karbapenemazy

Informacje i porady dla pacjentów

Kontrola infekcji

Jeśli chcesz zasugerować jakiegokolwiek poprawki lub zmiany w tej broszurze, skontaktuj się z SWB Library Services pod numerem wewnętrznym 3587 lub napisz na adres swbh.library@nhs.net.



Trust edukacyjny Uniwersytetu Birmingham

Obejmujący Midland Metropolitan University Hospital, City Health Campus, Sandwell Health Campus oraz Rowley Regis Hospital.

© Sandwell and West Birmingham NHS Trust

M7759

Data wydania: wrzesień 2024 r.

Data przeglądu: Wrzesień 2027 r.

Czym są bakterie Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy?

CPE (lub CRO) to rodzaj bakterii, które stały się odporne na karbapenemy, grupę silnych antybiotyków. Oznacza to, że bakterie te mogą powodować infekcje odporne na antybiotyki karbapenemowe oraz wiele innych antybiotyków.

Dlaczego oporność na karbapenemy jest tak ważna?

Lekarze polegają na antybiotykach karbapenemowych w skutecznym leczeniu niektórych skomplikowanych infekcji, gdy inne antybiotyki zawodzą. Rozprzestrzenianie się tych opornych bakterii może powodować problemy u szczególnie narażonych pacjentów w szpitalach lub innych placówkach, ponieważ dostępnych jest niewiele antybiotyków do leczenia infekcji, które te bakterie powodują.

Pacjent z dodatnim wynikiem CPE – Jak można zarazić się tą infekcją i jakie są jej objawy?

Te bakterie mogą występować, nie wywołując żadnych niepożądanych objawów, w ludzkich jelitach, więc trudno jest określić, kiedy lub gdzie doszło do zarażenia. Jednak istnieje zwiększone prawdopodobieństwo zarażenia u osób hospitalizowanych w szpitalu za granicą lub w Wielkiej Brytanii, w którym przebywali pacjenci będący nosicielami tych bakterii lub



jeśli do kontaktu z nosicielem doszło w innym miejscu.

Kiedy zgłosisz się do szpitala

Musisz natychmiast przedstawić ten list i/ lub kartę CPE personelowi, aby otoczył Cię odpowiednią opieką.

Jak będzie wyglądać Twoja opieka w szpitalu?

W szpitalu możesz trafić do jednoosobowej sali z toaletą lub na określony oddział. W zależności od długości Twojego pobytu personel może poprosić Cię o dostarczenie kilku próbek, aby sprawdzić, czy jesteś osobą zakażoną lub nosicielem tej bakterii. Próbkę mogą obejmować wymazy z określonych obszarów, takich jak miejsce, w którym rurka do kroplówki (jeśli używana) wchodzi w skórę, wymaz z odbytu (próbka pobrana przez krótkie wprowadzenie wymazówki do odbytu) i/lub próbkę kału.

Jak można zapobiec rozprzestrzenianiu się CPE

Pobyt w jednoosobowej sali lub określonym obszarze pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii. Pracownicy opieki zdrowotnej będą używać rękawiczek i fartuchów podczas opieki nad Tobą i powinni regularnie myć ręce. Najważniejszym środkiem, który możesz podjąć jest dokładne mycie rąk



mydłem i wodą, szczególnie po skorzystaniu z toalety. Należy unikać dotykania urządzeń medycznych (jeśli są używane), takich jak rurka cewnika moczowego i kroplówka dożylna, szczególnie w miejscu, w którym wchodzi do ciała lub skóry. Odwiedzający będą proszeni o umycie rąk przed wejściem i po wyjściu z sali i mogą zostać poproszeni o założenie fartucha.

Co się stanie po powrocie do domu?

Możesz nadal być nosicielem CPE po powrocie do domu. Często ustępuje to samoistnie. W domu nie są wymagane specjalne środki ani leczenie. Możesz kontynuować normalne życie, pamiętając o prawidłowej higienie rąk. Jeśli masz jakiegokolwiek obawy, możesz skontaktować się z lekarzem rodzinnym w celu uzyskania porady. Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny zostaniecie przyjęci do szpitala, poinformuj personel szpitala, że jesteś osobą, która jest lub była nosicielem CPE, i pokaż im list/kartę.

Jak długo można być nosicielem tej bakterii?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak długo można być nosicielem tej bakterii. Czas ten może wynosić od kilku dni do bliżej nieokreślonego czasu.

